

## **Het afplakken van de baby-oorschelp met een afwijkende vorm**

Uw baby is gezien door een medewerker van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en er is geconstateerd dat er mogelijk sprake is van een afwijkende vorm van de oorschelp. U kunt hiervoor doorverwezen worden.

In deze folder leest u meer over oorafwijkingen bij baby's en de mogelijkheden om deze nu op redelijk eenvoudige wijze te corrigeren.

### **Zacht kraakbeen oorschelp**

Baby's kunnen geboren worden met een afwijkende vorm van de oorschelp, bijvoorbeeld een afstaand oortje of een puntige vorm van de oorschelp. Omdat het kraakbeen nog zacht is vlak na de geboorte, kan dit vaak goed gecorrigeerd worden met pleisters of met een spalkje. Een operatieve correctie kan vaak pas op latere leeftijd gedaan worden (ongeveer na het zesde levensjaar).



Afstaand oor



Stahl's oor



Lop oor

### **Welke oor afwijkingen kunnen gecorrigeerd worden met afplakken?**

Niet alle oorafwijkingen kunnen met afplakken behandeld worden. Bij een onderontwikkelde oorschelp of bij het ontbreken van een oorschelp is er geen mogelijkheid voor afplakken.

De volgende afwijkingen kunnen WEL behandeld worden:

- Een afstaand oortje
  - o Hierbij ontbreekt de binnenvouw van de oorschelp, waardoor de vrije rand af komt te staan
- Knik in de oorschelp
  - o Hierbij is de bovenpool van het oor ingedeukt, waardoor het oortje in verticale hoogte is afgenomen
- Stahl's oor
  - o De oorschelp heeft een puntige vorm. Dit wordt ook wel Spock-oor genoemd
- Lop oor
  - o Hierbij is sprake van een overhang van de bovenrand van het oor (de rand is omgeklapt). Soms corrigeert dit vanzelf in de eerste paar uur na de geboorte.
- Cryptotia ('Het verborgen oor')
  - o Het bovenste gedeelte van de oorschelp is verborgen onder de huid. Als het oortje opzij wordt getrokken, dan wordt het bovenste gedeelte ook zichtbaar.

### **Hoe werkt het afplakken?**

Omdat het kraakbeen nog zacht is vlak na de geboorte, kan dit vaak goed gecorrigeerd worden met pleisters of met een spalkje. Nadat is vastgesteld wat de afwijkende vorm is, zal het oortje met een smalle pleister in de juiste vorm worden afgeplakt. Soms is het nodig om een spalkje te gebruiken om

de juiste vorm te krijgen. Het spalkje wordt dan passend gemaakt voor het oortje van uw baby en vastgezet met de smalle pleisters.

Soms is het nodig om wat hoofdhaar gedeeltelijk te scheren, zodat de steristrips beter geplakt kunnen worden en langer blijven zitten.

Uw baby merkt niet veel van het afplakken. De behandeling doet geen pijn en de baby kan ongestoord slapen op het te behandelen oortje.



### **De eerste afspraak**

Bij het eerste consult wordt beoordeeld of de afwijking behandeld kan worden met het afplakken en/of een spalkje. De behandeling gaat in principe meteen beginnen. U als ouder/verzorger krijgt uitleg en tips hoe u dit thuis ook zelf kunt doen.

Het afplakken of spalken van de oortjes heeft het meeste succes als zo snel mogelijk na de geboorte wordt begonnen met de behandeling. Daarom is het van belang zo snel mogelijk een afspraak te maken. Na de leeftijd van 6 weken heeft het nagenoeg geen zin meer om te starten.

Indien u een vermoeden hebt (of er met u besproken is), dat er sprake is van een afwijkende vorm van de oorschelp, dan kunt u, na verwijzing door de Jeugdarts van het consultatiebureau, bellen naar onderstaande MKA-poliklinieken voor een afspraak.

**Spaarne Gasthuis locatie Haarlem**  
**Afdeling Mond-, Kaak- en Aangezichts chirurgie**  
Boerhaavelaan 22  
2035 RC Haarlem  
tel nr. 023-2240080

**Spaarne Gasthuis locatie Hoofddorp**  
**Afdeling Mond-, Kaak- en Aangezichts chirurgie**  
Spaarnepoort 1  
2134 TM Hoofddorp  
tel nr 023-2240080

**Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk**  
**Afdeling Mond-, Kaak- en Aangezichts chirurgie**  
Vondellaan 13  
1942 LE Beverwijk  
tel nr 0251-265697

**<https://www.mka-kennemerland.nl>**