

Het afplakken van de baby-oorschelp met een afwijkende vorm

Je baby is vandaag onderzocht door een jeugdverpleegkundige en/of jeugdarts van het consultatiebureau. Zij heeft gezien dat de oorschelp van je kind misschien een afwijkende vorm heeft. Je bent hiervoor verwezen.

Het afplakken of spalken van de oortjes heeft het meeste succes als zo snel mogelijk na de geboorte wordt begonnen met de behandeling. Het is belangrijk om zo snel mogelijk een afspraak te maken. Na de leeftijd van 6 weken heeft een behandeling geen zin meer.

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar onderstaande MKA-poliklinieken voor een afspraak:

Spaarne Gasthuis locatie Haarlem

Afdeling Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Boerhaavelaan 22

2035 RC Haarlem

Telefoonnummer 023-2240080

Spaarne Gasthuis locatie Hoofddorp

Afdeling Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Spaarnepoort 1

2134 TM Hoofddorp

Telefoonnummer 023-2240080

Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk

Afdeling Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Vondellaan 13

1942 LE Beverwijk

Telefoonnummer 0251-265697


<https://www.mka-kennemerland.nl>

Tijdens de eerste afspraak wordt bekeken of de oorafwijking behandeld kan worden door af te plakken. De behandeling kan dan meteen beginnen. En jij krijgt uitleg en tips over hoe je dit thuis ook zelf kunt doen.

In deze folder leest je meer over oorafwijkingen bij baby's. Ook staan hier de mogelijkheden van behandeling in.

Zacht kraakbeen


Baby's kunnen geboren worden met een afwijkende vorm van de oorschelp. De oorschelp kan bijvoorbeeld afstaan of een puntige vorm hebben. Vlak na de geboorte is het kraakbeen van de oorschelp nog zacht. Met pleisters of een spalkje kan de vorm vaak nog goed hersteld worden. Dit kan tot op de leeftijd van 6 weken. Later kan dit alleen nog hersteld worden met een operatie na ongeveer het zesde levensjaar.



Afstaand oor



Stahl's oor



Lop oor

Welke oorafwijkingen kunnen worden behandeld met afplakken?

Een veel te kleine oorschelp of een afwezige oorschelp kunnen **niet** behandeld worden met afplakken. De volgende afwijkingen kunnen **wel** behandeld worden:

- Een afstaand oortje
 - De binnenvouw van de oorschelp is er niet, waardoor de vrije rand af komt te staan.
- Knik in de oorschelp
 - De bovenkant van het oor is ingedeukt, waardoor het oor in minder hoog is.
- Stahl's oor
 - De oorschelp heeft een puntige vorm. Dit wordt ook wel Spock-oor genoemd.
- Lop oor
 - De bovenrand van het oor is omgeklapt. Dit kan in de eerste paar uur na de geboorte vanzelf verdwijnen.
- Cryptotia ('Het verborgen oor')
 - Het bovenste deel van de oorschelp is verborgen onder de huid. Als het oor opzij wordt getrokken dan wordt het bovenste gedeelte ook zichtbaar.

Hoe werkt het afplakken?

Het kraakbeen is nog zacht na de geboorte. Een afwijkende vorm kan dan nog goed met aangepast worden. Nadat de vorm van de oorschelp goed is bekeken zal het oor met een smalle pleister in de juiste vorm worden afgeplakt. Soms is het nodig om een spalkje te gebruiken. Het spalkje wordt speciaal gemaakt voor het oor van jouw baby en vastgezet met smalle pleisters.

Soms is het nodig om wat hoofdhaar weg te scheren, zodat de pleisters beter geplakt kunnen worden en langer blijven zitten. Je baby merkt niet veel van het afplakken. De behandeling doet geen pijn en de baby kan gewoon liggen op het behandelde oor.

